



小児のワクチン接種について



日本クラブ診療所では以下の予防接種を行っています。

基本は英国の方式(NHS推奨)に準じていますが、一部日本の方式に合わせて変えています。どの時点で帰国または他国に赴任となっても問題ない方法ですので、ご安心下さい。

主なワクチンの名称

- DPT(Diphtheria : ジフテリア, Pertussis : 百日咳, Tetanus : 破傷風)
- IPV(Inactive Polio Vaccine : 不活化ポリオワクチン)
- Hib(Haemophilus influenzae B : ヒブ)
- MMR(Measles : はしか, Mumps : おたふく, Rubella : 風疹)
- Men-C(Meningitis C : 髄膜炎菌C)
- DT(Diphtheria : ジフテリア, Tetanus : 破傷風)
- Pneumococcus(肺炎球菌)
- Chicken pox(水痘)
- Rotavirus(ロタウイルス)
- Hep B(B型肝炎)
- HPV(ヒトパピローマウイルス)



■当院での基本接種予定■

- 2か月頃 5種(DPT+Hib+IPV)① / 肺炎球菌①
- 3か月頃 5種(DPT+Hib+IPV)② / 髄膜炎菌C①
- 4か月頃 5種(DPT+Hib+IPV)③ / 肺炎球菌② / 髄膜炎菌C②
- 6か月頃まで BCG①
- 12か月頃 Hib+髄膜炎菌C③
- 13か月頃 MMR① / 肺炎球菌③
- 1.5-3歳未満 3歳までに帰国する場合は④日本
- 3才～5才 MMR② / 4種(DPT+IPV) ④英国
- 12才 3種(DT+IPV) HPV①②③(女兒のみ)



	2か月	3か月	4か月	～6か月	12か月	13か月	～3才未満	3～5才	12才
DPT							④日本	④英国	DT+IPV
ポリオ(注射)	①	②	③						
Hib					③				
髄膜炎C		①	②						
BCG				①					
MMR						①		②	
肺炎球菌	①		②			③			
水痘(任意)					①←6週以上の間隔を空けて→②				
B型肝炎(任意)	任意の時期に①←4週以上→②←初回より6ヶ月以上→③								
Rotavirus(任意)	4週以上の間隔で2回接種								
HPV(女兒のみ)									① ② ③

- ※日本では麻疹と風疹の混合ワクチンMRを使用しますが、英国では流行性耳下腺炎を追加したMMRになります。
- ※2007年より、小学校入学前に2度目のMRを接種をするようになりました。
- ※2011年より、日本ではロタウイルスワクチンの任意接種が始まりました。
- ※ロタウイルスワクチンは4週以上の間隔で2回の接種を遅くとも6ヶ月までに行います。
- ※日本では従来一回接種であった水痘や流行性耳下腺炎も効果の面から2回の接種が勧められるようになっています。
- ※日本で予防接種を途中まで受けて渡英された方や、今後帰国予定の方は接種内容をご相談下さい。

検診、予防注射時は、ご家庭でお熱を計ってきてください。母子手帳やRed Bookを忘れずにお持ちください。ご予約・お問い合わせは下記までお気軽にどうぞ。

日本クラブ北診療所 Tel: 020-7266-1121
日本クラブ南診療所 Tel: 020-8971-8008

